

**AUTORITATEA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ NEAMȚ
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
SERVICIUL DE SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL BOLI TRANSMISIBILE, TEL. 0233-210524
Piatra Neamț, B-dul Traian nr.1, Cod 610136
Nr. 6031 din 29.06.2014**

Comunicat de presă

Având în vedere că în ultimile trei săptămâni s-au înregistrat în județul Neamț 3 suspiciuni de leptospiroza și a faptului că aceasta boala prezintă mai multe cazuri în sezonul estival va prezentam câteva date despre aceasta boala.

În ultimii 5 ani în jud. Neamț s-au înregistrat în medie 15 suspiciuni /an din care s-au confirmat în medie 5 cazuri /an.

Pentru fiecare suspiciune s-a realizat ancheta epidemiologică în vederea depistării factorilor de risc implicați și a aplicării de măsuri antiepidemice impuse.

Ce este leptospiroza?

Leptospiroza este o boală infecțioasă provocată de o bacterie din genul *Leptospira*. Boala se caracterizează prin următoarele semne și simptome: febră, frisoane, dureri de cap (cefalee), dureri musculare, vărsături, icter (colorația galbenă a sclerelor și a tegumentului), hiperemie conjunctivală (ochii roșii), dureri abdominale.

Dacă pacientul nu se prezintă la medic pentru diagnostic și tratament boala se poate agrava, cu afectarea rinichiului, ficatului, care pot duce la deces. Multe din simptomele bolii sunt asemănătoare altor boli (hepatita acută virală, meningita acută, viroza acută respiratorie) și numai medicul poate pune diagnosticul corect după efectuarea analizelor de laborator.

Cum se transmite boala?

Leptospiroza este o antropozoonoză, o boală care se transmite de la animale la om. De obicei boala apare ca urmare a contactului cu apă în care a ajuns urina animalelor bolnave de leptospiroză sau purtătoare de bacterii din genul *Leptospira*. Multe mamifere pot fi purtătoare sănătoase de leptospira: porcul, câinele, şobolanii etc.

Oamenii se îmbolnăvesc prin contactul cu animalele bolnave (de exemplu muncitorii din fermele de porci pentru care leptospiroza este o boală profesională), contactul cu apă contaminată cu urina animalelor infectate (îmbăierea în bălți, lacuri, canale de irigație, râuri), ingestia alimentelor contaminate cu urina animalelor infectate (de către şobolani de exemplu).

Leptospira pătrunde în organism prin piele, mucoasa nazală și oculară sau prin alimentele sau apă de băut contaminate cu *Leptospira*. Boala nu se transmite de la om la om. Perioada de incubație a bolii (de la contactul cu sursa de infecție și până la apariția semnelor de boală) variază între 2 zile și 2 săptămâni.

Răspândirea bolii

Leptosiroza este răspândită pe tot globul dar mai frecvent în zonele tropicale și temperate. Apare frecvent la persoanele care lucrează în crescătoriile de porci, medici veterinari, pescari, militari, muncitori la canalizare, muncitori agricoli în special în orezării, fermele de vaci etc.

Boala poate apărea la turiștii care stau în cort, pe sol contaminat sau lângă o apă contaminată, la cei care practică sporturi pe sol contaminat sau apă contaminată.

De asemenea boala poate apărea la persoanele care se îmbăiază în lacuri, râuri și canale de irigație contaminate sau care au intrat în apele de inundații.

Cum poate fi prevenită boala?

Îmbăierea trebuie să se facă numai în ștrandurile special amenajate. Alimentele, apă potabilă, trebuie ferite de contactul cu animalele și în special rozătoare (șoareci, şobolani).

Persoanele expuse la îmbolnăvire prin profesie sau activități recreative în zone posibil contaminate cu leptospira trebuie să ia măsuri specifice de protecție (echipament de protecție, încălțăminte impermeabilă).

Cum se recunoaște boala?

Persoanele suspecte de leptosiroză pot prezenta următoarele simptome: febră, céfalee, curbatură (dureri musculare), dureri abdominale, icter sclerotegumentar, hiperemie conjunctivală, trebuie să se prezinte de urgență la medicul de familie pentru diagnostic și internare într-un serviciu specializat de boli infecțioase.

Cum se tratează boala?

Leptosiroza este o boală care poate fi tratată, de aceea persoanele care știu că au staționat în zone posibil contaminate sau au făcut baie în râuri, lacuri canale de irigație, sau au la domiciliu o infestație mare cu rozătoare (şobolani, șoareci), în caz că prezintă simptomele descrise trebuie să se prezinte de urgență la medicul de familie pentru diagnostic și internare într-un serviciu specializat de boli infecțioase.

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,

Dr. Daniela Florina Marcoci

